

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ

В результате обследования балов, оврагов и выходов мела преимущественно в северо-западной и северо-восточной частях Северного Прикаспия в 1982-84 гг. были установлены новые местонахождения некоторых редких видов растений. Приведем краткие сведения об этих флористических находках.

Gentiana pneumonanthe L. — Горечавка легочная. Вид внесен в Красную Книгу СССР (1981). В Северном Прикаспии В.В.Иванов (1972) отмечает долину р.Урал между Кинделями и Бородинским, С.А.Никитин — Кара-Агач (1957). Нами в 1982 г. горечавка отмечена в долине р.Урал, около с.Январцево и установлено новое местонахождение ее по старому руслу р.Быковки (спадаящая с Общего Сырта) в 7 км от с.Чирово Приуральского р-на Уральской обл. По словам местных жителей, горечавка встречалась всегда, так как здесь были леса; это же подтверждают встречающиеся виды земляники лесной, душицы обыкновенной, зверобоя продырявленного и др. Горечавка очень декоративна и поэтому собирается на букеты; запасы ее сокращаются и из-за вырубания лесов, выпаса скота в местах ее произрастания.

Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха. В.В.Иванов (1966) указывает ее как очень редкий вид нашего края. Он отмечает находки С.Г.Колманова по Кара-обе в овраге севернее Уила, а также С.И.Ростовцева в окр.Уральска. 29.VI.1982 г. мы встретили мать-и-мачеху на левом крутом берегу р.Урала у с.Красная Школа. Она образовала почти сомкнутый покров, а также на глинистых обрывах оврага возле с.Понатиловка (оба пункта находятся в Теректинском р-не Уральской обл.). I.08.1984 г. мы обнаружили ее в овраге на северном склоне около р.Таловой вблизи полевого стана Юрьино Зеленовского р-на этой же обл.

Caltha palustris L. — Калужница болотная. 5.09.1983г было отмечено новое местонахождение калужницы в леске около с.Кутантал Чингирлауского р-на Уральской обл., на влажных понижениях. В нашем крае В.В.Иванов (1971) отмечает ее южнее Соболеви и р.Киш, а также указывает на находки И.В.Ларина в отрогах Общего Сырта.

Parnassia palustris L. — Белозор болотный. Весьма ре-

док для нашего края. В.В.Иванов (1977) обозначает три местонахождения - Мугоджары сев.Берчогура, Бадпакты, Шокпар-Сай Актобинской обл. Нами белозор найден 5.09.1983 г. в том же пункте, где была найдена калужница. Он встречается в понижении леса, на сырых болотистых местах, преимущественно около кочек.

Jnula helenium L.

— Девясил высокий. В своей работе В.В.Иванов (1966) отмечает распространение девасила преимущественно в северной части. Нами зарегистрированы более южные местонахождения - ур.Амангельды и лесок у Кутантала, а также в окр.Меловых гор. Девясил издавна известен как лекарственное растение, его корневища заготавливают в ур.Амангельды в Чижинских разливах.

Ranunculus sceleratus L. — Лютик ядовитый. II.06.1984 г.

отмечен на Общем Сырте в овраге у ручья около с.Крутая, а I.08. зарегистрирован около родничка в овраге около р.Таловой, вблизи полевого стана Юрьино (оба пункта находятся в отрогах Общего Сырта). I7.07.1984 г. лютик найден возле источника рядом с ур.Алтабас в окр. с.-за Миргородский Бурлинского р-на Уральской обл. В.В.Иванов (1971) указывает местонахождения около Уральска, Илек, Чубар-Агач, Кок-Джиды и Чижинские разливы.

Convallaria majalis L.

— Ландыш майский. Обычным местонахождением является пойма р.Урала. Но, кроме поймы, встречается в отрогах Общего Сырта в байрачных лесах от с.Рассыпного до Нижнеозерного Оренбургской обл. Растения собираются с коммерческой целью и поэтому опасность уничтожения крайне велика. И охрана его или частичный запрет сбора был бы своевременным для сохранения вида. Необходимо отметить, что среднее течение р.Урал является южной границей распространения ландыша (Горчаковский, 1968).

В Северном Прикаспии часто на поверхность выходят меловые породы, они приурочены к долинам рек, реже встречаются на водоразделах и балкам и оврагам. Довольно значителен удельный вес в нашей флоре петрофитов и кальцефитов, которые отличаются от зональной степной флоры видовым составом и наличием эндемичных видов. Среди последних можно выделить: *Lepidium meyeri* — клоповник Мейера, *Lenaria cretacea* — лишайник меловая, *Anthemis trotzkiana* — пулавка Корнух-Троцкого, *Nanophiton erinaceum* — нанофитон ежевый, *Polygala comosa* — истод хохлатый, *Pimpinella titanophila* — бедренец известковолюбивый, *Limonium macrorhizon* — кермек крупнокорневой.

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge. — Пулавка Корнух-Троцкого. Эндемик Юго-Востока Европейской части. Внесен в Красную

Книгу СССР (1975, 1981). В.В.Иванов (1966) нашел пупавку в следующих пунктах: Ичка, Общий Сырт, меловые выходы по Утве, Ишкурган-Тау, Ачка-Тау. О.Т.Кольченко (1975) отмечает 16 местонахождений (в них входят и выше названные пункты, а также Старая Белогорья, Нижнеозерное, Степное, Джеренътау, Аккудуксай, Сантас, Шангроу, Итас, Акулагай, Иманнара). Нами в 1984 г. отмечены два новых местонахождения пупавки в ур.Алгабас и на Меловой горе у с.Мелового Озинского р-на Саратовской обл. Она встречается на меловых склонах и обрывах, реже на вершине. Рядом с ней клоповник Мейера, резушка толстокорневая, льнянка меловая (последняя внесена в Красную книгу СССР, 1975, 1981). Гораздо беднее второе местонахождение, здесь левый пахучий и мордовник обыкновенный. Необходимо отметить, что местообитания пупавки сокращаются в результате разработки меловых карьеров и выпаса скота. Для сохранения вида необходимо создание заказников (Иванов, 1971) в районе г.Ички, Иманнары и Акулагая.

Л и т е р а т у р а

Горчаковский П.Л. Растения европейских широколиственных лесов на восточном пределе их ареала. Свердловск, 1968.

Иванов В.В. Сложноцветные Северного Прикаспия. - Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Л., 1966, в.2, ч.3.

Иванов В.В. Лютиковые Северного Прикаспия. - Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Л., 1971, в.5, ч.1.

Иванов В.В. Ботанические объекты Северного Прикаспия, нуждающиеся в охране. Л., 1971.

Иванов В.В. Горечавковые Северного Прикаспия. - Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Л., 1972, в.6, ч.4.

Иванов В.В. Дополнение к ранее опубликованым ключам флоры Северного Прикаспия. - В кн.: Ботаническая география Северного Прикаспия Л., 1977.

Красная книга СССР. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Л., 1975.

Редкие и исчезающие виды флоры СССР. Л., 1981.

Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. Л., 1981.