

Т.Б.Дарбаева

РЕДКИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ БАЙРАЧНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ

В пределах Северного Прикаспия байрачные леса приурочены к балкам и оврагам Общего Сырта и Предуралья. В северной части – леса у Рассыпного и Нижнеозерного, Белый Ключ и у Старой Белогории, урочище Амангельды. В западной части – леса у Беленького, Крутой, Главного, склона г.Ички. В восточной – урочище Сагиз-Сай и леса, приуроченные к западным отрогам Мугоджар – Шокпар-Сай, и на средней Эмбе Какна-Терек.

Первые упоминания о байрачных лесах находим у И.В.Ларина (1929). Материалы, характеризующие такие леса, содержатся в работах В.В.Иванова (1956, 1960, 1971), С.А.Никитина (1957), А.З.Петренко (1971).

В.В.Иванов (1951), исследуя байрачные дубравы, указывает дубо-

вую рощицу с подлеском из лещины вблизи с.Амангельды на левом берегу р.Урала, которая является самой южной точкой ареала лещины на Юго-Востоке Европейской части. В настоящее время из-за антропогенного воздействия, а также в результате обвалов берега р.Урала местобитание лещины *Corylus avellana* L. сокращается. Учитывая не только реликтовый характер местонахождения лещины, но и вообще редкую сохранность дуба на Юго-Востоке, следовало бы поднять вопрос о выделении этого участка в качестве заповедного, отмечал В.В.Иванов еще в 1951 г. Рощица находится в ведении колхоза, но ее необходимо передать в Чаганское лесничество, расположенное в одном километре от колхоза. Там находятся байрачные лески с редкими древесными и травянистыми видами - ур.Амангельды. Вопрос о создании заказника областного значения в ур.Амангельды (Иванов, 1971) остается открытым до сих пор.

Позже П.Л.Горчаковский (1968), исследуя бассейн среднего течения р.Урал, указывает, что здесь же (ур.Амангельды) проходит южная граница бересклета *Euonymus verrucosa*. Он встречается в Воронской и Ахмадиевской балках. Бересклет зарегистрирован в балке Абынсай под пологом березы, произрастает отдельными экземплярами по западному меловому склону. Отмечен он и в рощи Медвежья, между Расыпным и Нижнеозерным. Растет в подлеске широколиственных и хвойно-широколиственных лесов (Флора СССР, XIV), редкое растение для нашего края, нуждается в охране.

Байрачные леса служат не только пределом южного распространения названных видов, но и убежищами (Лавренко, 1940) для редких реликтовых растений, переживших ледниковую эпоху. Редко и очень редко встречаются калина *Viburnum opulus* L. (Амангельды, Медвежья), рябина *Sorbus aucuparia* L. (Медвежья), кизильник *Cotoneaster melanocarpus* F. ex Blytt (Амангельды, Кутантал), яблоня *Malus sylvestris* Mill. (окр.Меловых гор, Аксуат, Амангельды и в долине р.Малого Узень - находки В.Д.Утежина). В балках яблоня произрастает преимущественно по южным склонам, в верховьях и реже на конусах выноса. Она является, несомненно, родоначальным видом для целого ряда среднерусских сортов культурной яблони и поэтому весьма интересна как материал для подвоя культурных сортов (Иванов, 1971). Все сохранившиеся экземпляры ее должны быть взяты под самую строгую охрану.

Растительный покров края замечателен тем, что здесь сталкиваются представители различных зон, например, можжевельник и береза, растущие здесь же в нескольких десятках метров друг от друга.

Такое сочетание можно встретить в ур.Сегиз-Сай. Как известно, можжевеловый *Juniperus sabina* L. внесен в Красную Книгу СССР (1975, 1981). В Северном Прикаспии следует включить следующие местонахождения его: Сегиз-Сай по р.Калдыгайте от с.Лебедевка до Киндикюля, самый крупный массив Кара-Агач по р.Булдурте в песках Кокузеккум, меньшее по размерам в верховьях р.Калдыгайты (вблизи Кендикты). Нам удалось посетить (1981) лески, состоящие из можжевельника, в районе Лебедевки. Лески являются можжевелевыми урочищами. Все местонахождения этого очень декоративного кустарника нуждаются в срочной охране. Необходимо восстановить существовавшее раньше лесничество с центром в Кара-Агаче.

На безлесных просторах нашего края байрачные леса имеют большое значение как источники лесной продукции, так и в расселении растений. И возможно, упомянутые выше виды смогут быть использованы в озеленении, лесном хозяйстве и значительно шире, чем интродуценты.

Л и т е р а т у р а

Горчаковский П.П. Растения европейских широколиственных лесов на восточном пределе их ареала. Свердловск, 1968.

Иванов В.В. Лещина в долине р.Урала. Бот.ж. 1961, т. XXXVI № 3.

Иванов В.В. Ботанические объекты Северного Прикаспия, нуждающиеся в охране. Л., 1971.

Иванов В.В. Розовые Северного Прикаспия. - Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Л., 1971, в.5, ч.2.

Красная Книга СССР/под ред. академика А.Л.Тахтаджяна, Л., 1975.
Лавренко К.М. Степи СССР - В кн.: Растительность СССР. М.-Л., 1940.

Редкие и исчезающие виды флоры СССР/Под ред. А.Л.Тахтаджяна. Л., 1981.

Черепанов С.В. Сосудистые растения СССР. Л., 1981.