

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗИМОВКАМ РУКОКРЫЛЫХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.П.Снитко

Ильменский государственный заповедник УрО РАН, г.Миасс

В марте 2002 г. с целью выявления видового состава зимующих в Челябинской области рукокрылых проведено обследование четырех пещер Кургазак, Шумиха, Надежда и Понорная (Саткинский р-н, бассейн р.Ай). Работы проводились совместно с сотрудником национального парка «Зюраткуль» С.В. Юровским. Обнаружено 37 рукокрылых 6 видов: прудовая ночница (*Myotis dasycneme*); ночница Наттерера (*M. nattereri*); водяная ночница (*M. daubentoni*); ночница Брандта (*M. brandti*); северный кожанок (*Eptesicus nilssonii*); бурый ушан (*Plecotus auritus*) (Табл.1).

Больших зимовочных скоплений не обнаружено.

Животные располагались обособлено, и лишь в одном случае, в небольшой полости свода пещеры Кургазак, найдена группа из 5 летучих мышей (4 прудовых ночницы и ночница Брандта). Северный кожанок размещался открыто на стенах пещер непосредственно от входа до 20 м, остальные обнаруженные виды, как открыто, так и в полостях, небольших трещинах и за уступами сводов на расстоянии от 20 до 100 м от входа, при температуре 0-1°C. Наиболее представительны на зимовках были два вида *Myotis dasycneme* и *Eptesicus nilssonii* в сумме составившие 64,8%. *Myotis dasycneme* отмечена во всех осматриваемых пещерах.

Таблица 1

Видовой и количественный состав рукокрылых обнаруженных на зимовках в четырех пещерах Саткинского района

№	Вид	Количество особей				Всего
		п. Кургазак	п. Шумиха	п. Надежда	п. Понорная	
1	Ушан	2	2	-	-	4
2	Северный кожанок	7	5	-	-	12
3	Ночница Брандта	1	2	1	-	4
4	Прудовая ночница	7	1	3	1	12
5	Водяная ночница	3	-	-	-	3
6	Ночница Наттерера	1	1	-	-	2
Итого		21	11	4	1	37

Из числа обнаруженных рукокрылых наибольший интерес представляет находка ночницы Наттерера (*Myotis nattereri*). Для Южного Урала эти животных известны по единичным находкам на зимовках в Баш-

кортостане в пещере Кызыл-Яр (Стрелков, 1970; Байтерьяков, 1990), а по старым данным - в Оренбургской области (Стрелков, Ильин, 1990). В Челябинской области вид добыт впервые.

Таблица 2

Морфометрические показатели ночниц Наттерера (*Myotis nattereri*)

Дата	Место отлова	Пол	Длина предплечья	Длина тела	Длина хвоста	Высота козелка	Длина уха	Вес
15.03.02	п. Шумиха	m ♂	40,3	46	39	12	17	7.900
14.03.02	п. Кургазак	f ♀	41,6	40	45	12	17	8,400

Таким образом, в настоящее время, с учетом ранее сделанных находок усатой ночницы (Снитко, 1999),

на территории области установлена зимовка 7 видов рукокрылых.

ЛИТЕРАТУРА

- Байтерьяков Р.Г. Новые данные о зимовках рукокрылых в Башкирии // Материалы 5 Всесоюз. совещ. по рукокрылым. Пенза, 1990. С. 78-80.
 Снитко В.П. Зимовка рукокрылых в пещерах Челябинской области // Plecotus et al. № 2, 1999. С. 121-122.
 Стрелков П.П. Оседлые и перелетные виды летучих мышей (Chiroptera) в Европейской части СССР. Сообщ. 1 // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир., отд. биол. Т. 75, вып. 2, 1970. С. 38-52.
 Стрелков П.П., Ильин В. Ю. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) юга Среднего и Нижнего Поволжья // Тр. АН СССР. Зоол. ин-т. Т. 225, 1990. С. 42-167.