

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА АИСТООБРАЗНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБЕЛОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

А.А.Аверин

Государственный природный заповедник «Бастак»

Забеловский заказник расположен в 40 км к западу от г.Хабаровска на левом берегу р.Амур, на территории Смиловичского района Еврейской автономной области. Он расположен в пределах Среднеамурской низменности. Район представляет собой заболоченную осоково-вейниковую равнину с небольшими лесными массивами на возвышениях. Лесообразующие породы: дуб монгольский, осина, берёза. Наибольшая высота этого района около 45 м над уровнем моря.

Главное богатство заказника это его реки, протоки и особенно озёра. На его территории находится самое большое озеро Еврейской автономной области – Забеловское. Его длина около 6 км, а ширина около 1 км, берега покрыты густыми зарослями цецени (водной рис).

В 2001 г. на северо-восточном берегу оз.Забеловского Комитетом природных ресурсов ЕАО при финансовой поддержке WWF был создан центр экологического мониторинга. Одной из главных задач его создания было проведение ежегодного и постоянного мониторинга за околотоводными птицами, в особенности в период осенне-весеннего пролёта.

Наша работа в заказнике началась с конца апреля 2001 г. За тот год мы провели три выезда в этот район (общей сложностью 18 дней), по 6 дней каждый. Период полевых работ охватывал начало весеннего пролёта (вторая половина апреля), период выкармливания птенцов (середина июля), конец осеннего пролёта большинства перелётных птиц (вторая неделя октября).

Исследования массовых видов Аистообразных проводились с помощью маршрутного учёта по методике Ю.С.Равкина (1973), редкие представители этого отряда фиксировались индивидуально.

Система класса принималась по «Составу и распространению птиц фауны СССР. Неворобьиные Nonpasseriformes» Степанян Л.С. (1975).

За выше указанный период полевых работ нами было зафиксировано 5 видов относящихся к 3 семействам, 5 родам.

Зеленая кваква – *Butorides striatus* (Linnaeus, 1766). Представители этого вида обычны в западной части оз. Забеловского среди зарослей цецени, мы нашли одну группу и насчитали в ней 24 особи. Но в остальной части заказника вид не был встречен на гнездовании, были лишь отмечены отдельные особи, совершающие ежедневные кормовые перелёты в пределах

всего озера и вейниковых сырых лугов вдоль берегов. По-видимому, ранее вид был распространён по всему берегу озера, на это указывают и опросные данные. Лишь после строительства на восточном берегу жилья птицы стали гнездиться на западной части озера. Это можно объяснить наличием фактора постоянного беспокойства со стороны человека, а также стайным образом жизни среди околотоводных птиц других видов, которые в силу своей «привлекательности» для охотников в качестве трофеев, стараются держаться подальше от человека.

Большая белая цапля – *Egretta alba* (Linnaeus, 1758). Всего было учтено 4 особи, три из них на оз.Забеловском среди большого числа кормящихся серых цапель, одна на западной границе заказника. Сложно сказать являются ли эти особи гнездящимися либо они кочуют по территории этого района. Но для всех них характерна тесная привязанность к небольшим озёрам и протокам в тихих, малозаметных местах.

Серая цапля – *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758). Данный вид является самым распространённым на оз. Забеловском, на южном берегу этого озера имеется гнездовая колония этих цапель в осиново-берёзовом лесу. Во второй половине апреля плотность этого вида на берегу оз.Забеловского составила немногим более 1 особи на 2 км², а на заболоченной кочкарниковой равнине 1 особь на 14 км², в осиново-берёзовом лесу птицы не встречались вовсе, что указывает на отсутствие в это время предгнездовой подготовки. С 6 по 12 июля соотношение плотности вида по трём основным биотопам заказника составила: на берегу и на озере Забеловском 20,4 особи на 1 км², по заболоченной вейниковой кочкарниковой равнине плотность была 5,3 особи на 1 км², в осиново-берёзовом лесу 0,16 особи на 1 км². Точно определить является ли, какая то часть цапель вылетевшими из гнезда следками мы определить не смогли. В период с 6 по 10 октября по всей площади озера мы ежедневно насчитывали от 57 до 66 особей. В это время птицы кормились на озере в течение всего светлого времени суток. Изредка одиночные птицы совершали перелёты на оз. Улановское находящееся в 4 км восточнее оз. Забеловского. Выраженного осеннего отлёта цапель мы не зафиксировали.

Колпица – *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758). За весь 2001г. на территории Забеловского заказника была встречена лишь одна особь в июле месяце в за-

падной части оз. Забеловского. Там она провела (по данным инспектора) ок. двух недель. Вероятней всего это кочующая особь, не приступившая в этом году к гнездованию.

Дальневосточный аист – *Ciconia boyciana* (Swinhoe, 1873). На территории заказника в период с 18 по 22 апреля, их плотность составила 1 особь на 200 км², а к западу от его границы на р.Петровская (юг Смирновского района) 17 апреля - 1 особь на 10 км² заболоченной кочкарниковой равнины. Данные изменения численности этого вида за столь короткий срок можно

объяснить цикличностью весеннего пролёта, имеющими место периодами спада пролётной активности периодами его возрастания. В июле на западной границе заказника в воздухе отмечалась группа из 6 птиц. В октябре в данном районе мы обнаружили гнездо, которое по всем признакам (помёт, перья) в этом году было жилое.

По данным Горобейко В.В. в 1999 г. на оз.Забеловском в апреле-мае на пролёте было учтено 8 чёрных аистов (*Ciconia nigra* L.).

ЛИТЕРАТУРА

- Аверин А.А., Бисеров М.Ф. Птицы Красной книги Еврейской автономной области в заказнике Забеловский // Тез. док. V Дальневосточной конференции по заповедному делу. Владивосток, 2001. С. 9-10.
- Равкин Ю.С. К методике учёта птиц лесных ландшафтов // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука, 1973. 375 с.
- Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 728 с.
- Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР. Неворобьиные. М.: Наука, 1975. 372 с. Воробьинообразные. 1978. 392 с.